

Liste: Haltbarkeit nach Anbruch

Prüfung und Genehmigung

Funktion:	Name:	Datum:	Unterschrift:
Autor	I. Wyss		
Leiter Klinikbetreuung	Dr. H. Plagge		
Leiter Klinische Pharmazie	D. Bornand		
Leiter Qualitätssicherung	Dr. S. Deuster		

Historie und Gültigkeitsdauer

**Die vorliegende Liste ersetzt die Version LL0030-V05, gültig ab: 03.05.2012
Diese Liste ist gültig bis zur nächsten Revision, längstens jedoch bis 3 Jahre nach dem Gültigkeitsdatum gemäss Kopfzeile**

Übergeordnete und Mitgeltende Dokumente

Dokumenten-Nr.:	Titel	Ausgabedatum
RL0023-V05	Listen	10/2012
	Arzneimittel - Kompendium der Schweiz	Onlineversion
	NRF	01/2012 [1]
RL0029-V03	Richtlinie Stabilität	06/2010 [2]

Verteiler

- Autorisierte Kopien gemäss Verteilerliste
- Informationskopien an:
 - Pflegepersonal
 - alle Stationen aller Kliniken

Beilagen

- Haltbarkeit nach Anbruch, Dokumenten-Nr.: LL0030-V06-B01

Die Angaben dieser Liste wurden nach bestem Wissen zusammengetragen, es kann jedoch keine Garantie über die Richtigkeit der Angaben übernommen werden.

Copyright Spital-Pharmazie 2014

Diese Liste darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors nicht kopiert und in andere Websites oder Medien übernommen werden.

Datum:	13.10.14
Seite:	2 von 3
Gültig ab:	siehe Deckblatt
Autorisierte Kopie Nr.:	siehe Deckblatt
Dokumentnummer:	LL0030-V06.doc

Haltbarkeit nach Anbruch
Liste
Zeichenerklärung

g	Gramm	mg	Milligramm
Gran	Granulat	ml	Milliliter
Gtt Opht	Augentropfen	RT	Raumtemperatur (15-25 °C)
KS	Kühlschrank (Lagerung bei 2-8 °C)	Susp	Suspension
Lagertemp	Lagertemperatur	Temp	Temperatur
Lsg / Lös	Lösung		

Wichtige Hinweise

- ⇒ Das angegebene Verfalldatum des Herstellers darf generell nicht überschritten werden. Dies gilt sowohl für die angebrochene und nicht angebrochene Packung
- ⇒ Sollte sich ein Arzneimittel im Laufe der Zeit verändern (z.B. Farbänderung oder vorher nicht vorhandene Trübung), so ist dieses nicht mehr zu verwenden
- ⇒ Auf Mehrdosenbehältnissen ist das Anbruchdatum und die daraus resultierende Verwendbarkeitsfrist oder das neue Verfalldatum zu vermerken. Unterstützend können die roten Anbruchetiketten (Art. 1109660 des Zentralmagazins) verwendet werden, die zusätzlich noch den Anbruch klar kennzeichnen und so Mehrfachanbrüche vermeiden helfen.
- ⇒ Allgemein sollten Arzneimittel nach Anbruch lichtgeschützt (im Umkarton) und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden und nach Gebrauch wieder gut verschlossen werden
- ⇒ Die Aufbrauchsfrist gilt bei auf Station herzustellenden Arzneiformen (z.B. Pulver zur Herstellung einer Suspension) immer ab dem Zeitpunkt der Herstellung/Auflösung
- ⇒ Grundsätzlich gelten die Aufbrauchsfristen in dieser Liste. Falls keine Angaben zu dem gesuchtem Arzneimittel zu finden sind, gelten die folgenden allgemeinen Aufbrauchsfristen nach Anbruch:

Allgemeine Aufbrauchsfristen nach Anbruch [1,2]

Konservierte flüssige Zubereitungen zum Einnehmen oder zur Anwendung in der Mundhöhle (Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Tropfen, Sirupe) Suspensionen und Emulsionen immer vor Gebrauch gut schütteln	6 Monate [1,2]
Konservierte flüssige Zubereitungen zur äusseren Anwendung (z.B. Shampoos)	6 Monate [1,2]
Konservierte Inhalationslösungen	4 Wochen [1,2]
Spüllösungen steril (unkonserviert und konserviert)	zum Einmalgebrauch [2]
Injektionslösungen und Infusionslösungen nach Anstechen und / oder Zumischen versch. Komponenten	Lösung sofort verabreichen und je nach Haltbarkeit der Wirkstoffe verwenden (gemäss Angaben im Arzneimittelkompendium), nach max. 24 Stunden verwerfen
Augentropfen und Augensalben in Mehrdosenbehältern	max. 4 Wochen ; nur für einen Patienten verwenden; die Tropfspitze immer sauber halten und nicht berühren [1,2]

Datum:	13.10.14
Seite:	3 von 3
Gültig ab:	siehe Deckblatt
Autorisierte Kopie Nr.:	siehe Deckblatt
Dokumentnummer:	LL0030-V06.doc

Haltbarkeit nach Anbruch

Liste

Augentropfen und Augengel in Einzeldosenbehältnissen (SDU)	zum Einmalgebrauch. Nach Öffnen des Beutels sind übriggebliebene Einzeldosen nach 1 Monat zu vernichten.
Nasentropfen	2 Wochen [1,2]
Nasenspray	6 Monate [1,2]
Zubereitungen zur Anwendung am Ohr	4 Wochen ; nur für einen Patienten verwenden [1]
Insuline	alle angebrochenen Insulin-Ampullen sind bei RT max. 4 Wochen nach dem ersten Anstechen haltbar. Sie dürfen nicht im Kühlschrank und nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahrt werden, das heisst eine Lagerung im Arzneimittelschrank unter Lichtschutz ist notwendig.
Salben und Cremes	bis zum angegebenen Verfalldatum (ausser Anwendung am Auge)

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9008596	3TC Trink Lös 10 mg/ml o alkohol 240 ml	RT	4 Wochen	RT	
9121318	5-AMINOLÄVULINSÄURE HCL 2 g	KS	2 Stunden (Lösung)	KS	
9108039	Accu Chek Dextrose 300 ml Saft	RT	zum Einmalgebrauch	/	enthält 0,01 bis 0,06 Vol.-% Alkohol, da der aus Geschmacksgründen zugesetzte Johannisbeermuttersaft Spuren von Alkohol aufweist.
9008447	ALCAINE Gtt Opht 15 ml	KS	4 Wochen	KS	
9120602	ALGIFOR Junior Susp 100 mg/5ml 200 ml	RT	6 Monate	RT	
9022552	ALPHAGAN Gtt Opht 5 ml	RT	4 Wochen	RT	
9086430	AMOXICILLIN Sandoz Gran 200 mg/4ml f Sus FI 100 ml	RT	14 Tage	RT	
4002600	AMPHO MORONAL Susp 10 % 24 ml	RT	6 Monate	RT	
9119760	AMUKINA Lös Plast FI 1000 ml	RT	3 Monate	RT	Lösung nicht mit Metall in Berührung bringen; kann Kleidung bleichen
4003853	Atropine SDU Faure 0.5 % 20 Monodosis 0.4 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 4 Wochen verwenden
4003846	Atropine SDU Faure 1 % 20 Monodosis 0.4 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 4 Wochen verwenden
9026526	Atrovent Inhal Lös 250 mcg/ 2 ml 60 Monodosis 2ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Lichtschutz einhalten, bei RT haltbar bis Verfalldatum
9036017	AUGMENTIN DUO Plv 457 mg f Susp FI 140 ml	RT	7 Tage	KS	
9032029	AUGMENTIN TRIO Plv 312.5 mg/5ml forte f Sus 100 ml	RT	7 Tage	KS	
9083334	BECETAMOL Tropfen 20 ml	RT	6 Monate	RT	
9038109	BELLAFIT N Tropfen 20 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 6% Alkohol
4002709	BEPANTHEN Lös 5 % 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9009223	BEPANTHEN NASENSALBE 5% 5 G	RT	7 Tage	RT	
4003125	BETADINE Gurgelmittel liq 120 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	enthält 36% Alkohol
4003123	BETADINE Lös 1:10 in NaCl 0.9% 250 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
9119188	BETADINE Lösung standardisiert 1000 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9019978	BETADINE Lösung standardisiert 120 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
4003128	BETADINE Seife liq 500 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9099431	BETOPTIC S single dose GttOpht 60x0.25ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
9017966	BEXIN Sirup 25 mg/10ml 150 ml	RT	6 Monate	RT	
9006080	BEXIN Tropfen 20.8 mg/ml 20 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 13% Alkohol
9092010	BRAMITOB Inhal Lös 300 mg/4ml Amp	KS	zum Einmalgebrauch	/	einhalten, bei RT haltbar bis zu 3 Monate; im KS haltbar bis Verfalldatum

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
4000456	BRAUNODERM Alk.Lös. farblos 1000ml Braun	RT	6 Monate	RT	
9121563	BRAUNODERM Alkoholische Lösung farblos 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9067831	BSS Serumwerk Augenspüllösung 500ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
4003552	BUCCO TANTUM liq 200 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 10.7% Alkohol
9106264	CARBOVIT Suspension 150 mg/ml oral FI 100 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
9046755	CEDAX Susp 36 mg/ml 60 ml	RT	14 Tage	KS	
9045954	CELLCEPT Susp 200 mg/ml FI 175 ml	RT	2 Monate	RT	
9028010	CERUMENEX Tropfen 10 ml	RT	6 Monate	RT	
9067427	CHLORAMIN Spüllösung 0.1 % 100 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
9109977	CHLORHEXIDIN Tinktur 2% 500 ml	RT	1 Jahr	RT	
9054315	CHLORHEXIDIN-D MSPül 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9036037	CIPROXIN HC Susp Auric 10 ml	RT	14 Tage	RT	
9034179	CIPROXIN Susp 5 g/100ml 100 ml	RT	14 Tage	RT	nicht auf den Kopf gestellt lagern
9058745	CITRAT Trinklösung FI 30 ml	RT	24 h	RT	
9055364	CLEXANE MULTI Lös 300 mg/3ml Stechamp 3 ml	RT	4 Wochen	RT	
9126011	CLINDAMYCIN Pfizer Gran 75mg/5ml FI 80ml	RT	2 Wochen	RT	
4003201	CLOPIXOL Tropfen 20 mg/ml 20 ml	KS	6 Wochen	RT	nur mit Wasser, Apfel-, oder Orangensaft mischen ; enthält 14,2% Alkohol
9097580	COFFEINCITRAT Injektion 20 mg/ml 10x5ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	Auch zur peroralen Anwendung
9010837	COLLUNOSOL N Nebul 50 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 5% Alkohol
9089245	COSOPT S Gtt Opht 60 Monodosis 0.2 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 15 Tagen verwenden
9008586	CYCLOGYL Gtt Opht 0.5 % 10 ml	RT	4 Wochen	RT	
4000554	CYCLOGYL Gtt Opht 1% 10 ml	RT	4 Wochen	RT	
9023090	DAFALGAN Sirup 3 % Inf 90 ml	RT	6 Monate	RT	
9091895	DALACIN T Aknelösung 1 % 60 ml	RT	6 Monate	RT	
9019699	DENTOHEXIN Lös 200 ml	RT	6 Monate	RT	
9050442	DENTOHEXIN Rachenspray 50 ml	RT	4 Wochen	RT	
9055288	DESOMEDIN DD Gtt Opht 10 x 0.6 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 4 Wochen verwenden
9074876	DEXAFREE UD GttOpht 0.1% 20Monodos 0.4ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
9007366	DIFLUCAN Susp 10 mg/ml 35 ml	RT	14 Tage	RT	

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9052639	DIMETHYLIS sulfoxidum (DMSO) 100g	RT	6 Monate	RT	für die Behandlung eines Patienten; Rest verwerfen
4003647	DIPROSALIC Lös 30 ml	RT	6 Monate	RT	
4001806	DISTRANEURIN Mixt 500 mg/10ml 300 ml	KS	6 Monate	KS	Beimischungen zur Mixtur sollten vermieden werden
9096215	DORMEASAN Tropfen 50 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 62% Alkohol
9046336	Dospir Inhal Lös 60 x 2.5 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Lichtschutz einhalten, bei RT haltbar bis Verfalldatum
9046269	DROSSADIN Lös 0.1 % 200 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 4.8% Alkohol
9126723	DUPHALAC Sirup FI 500 ml	RT	6 Monate	RT	
4001960	EFFORTIL Tropfen 7.5 mg/g 15 g	RT	6 Monate	RT	
9012135	ELOCOM Lös 0.1 % 30 ml	RT	4 Wochen	RT	
9047550	EMOFLUOR Mundbefeuchter Spray 75 ml	RT	6 Monate	RT	
9061990	EMOFLUOR Mundspülung 250 ml	RT	6 Monate	RT	
4002820	ESSIG-WEINSAURE-TONERDE Lös 3% 500 ML	RT	4 Wochen	RT	
9033187	EXELON Lös 2 mg/ml 120 ml	RT	4 Wochen	RT	
9087591	FENIALLERG Tropfen 1 mg/ml 20 ml	RT	6 Monate	RT	
9074904	FLAGYL Susp FI 25 mg/ml 120 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 1% Alkohol
9106876	FLATULEX Trpf 41.2mg/ml Dosierpumpe 50ml	RT	6 Monate	RT	
4004029	FLECTOR EP TISSUGEL Pflaster 10 Stk	RT	3 Monate	RT	Nach dem ersten Öffnen des Beutels sind die Pflaster innerhalb von 3 Monaten aufzubrauchen
9036882	Fluoresceine Oxybupro 0.4 % 20 Monodosis 0.4 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 4 Wochen verwenden
4002839	FML NEO LIQUIFILM Gtt Opht 5 ml	RT	4 Wochen	RT	vor Gebrauch schütteln, Flasche aufrecht lagern
9014439	FUCITHALMIC Augengel Monodosen	RT	zum Einmalgebrauch	/	4 Wochen nach Anbruch der Verpackungs-Folie unverbrauchte Monodosen verwerfen
9060047	GLYCEROL steril 50 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
4000774	GUTRON Tropfen 10 mg 20 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 14% Alkohol
4003212	HALDOL Tropfen 10 mg/ml 30 ml	RT	6 Monate	RT	
9126314	HALDOL Tropfen 2 mg/ml 30 ml	RT	6 Monate	RT	
9056481	HEPARIN NA Braun 25000 E/5ml Stechamp 5 ml	RT	14 Tage	RT	Die Entnahme von Lösung aus dem Behältnis hat unter sterilen Bedingungen zu erfolgen. Nur verwenden, wenn die Lösung klar ist.
4003216	IMODIUM Sirup 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9080028	INFECTOMYCIN 200 Saft 200 mg/5ml FI 100 ml	RT	14 Tage	KS	
9105216	INFECTOTRIMET Saft 50mg/5ml FI 75ml	KS	2 Monate	KS	
9008816	INSULIN HUMALOG Inj Lös Stechamp 10 ml	KS	4 Wochen	RT	
9026220	INSULIN HUMALOG MIX 25 Inj Susp f Pen Amp 3 ml	KS	4 Wochen	RT	

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9032644	INSULIN HUMALOG MIX 50 Inj Susp f Pen Amp 3 ml	KS	4 Wochen	RT	
9007084	INSULIN Insulatard HM Amp 10 ml	KS	4 Wochen	RT	
9059018	INSULIN LANTUS für Optipen Amp 3 ml	KS	4 Wochen	RT	
9058465	INSULIN LEVEMIR Penfill Inj Lös Amp 3 ml	KS	4 Wochen	RT	
9049793	INSULIN NOVOMIX 30 Penfill Inj Lös Amp 3 ml	KS	4 Wochen	RT	
9052817	INSULIN NOVORAPID Inj Lös Amp 10 ml	KS	4 Wochen	RT	
4001936	ISOKET Dosieraeros 15 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 85% Alkohol
9090638	KALETRA Sirup 60 ml	KS	6 Wochen	RT	enthält 42% Alkohol
4002761	KALIUMPERMANGANAT LÖSUNG 5% 100 ML	RT	6 Monate	RT	
9040026	KAMILLOFLUID liq 100 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 54% Alkohol; bei Einläufen ist auf die richtige Verdünnung zu achten, um Reizerscheinungen zu vermeiden
9082287	KA-VIT Tropfen 5 ml	RT	3 Monate	RT	
9073747	KEPPRA Lös 10 % 300 ml	RT	7 Monate	RT	
9013024	KLACIPED Susp 125 mg/5ml 100 ml	RT	14 Tage	RT	
9117131	LAVASEPT Lös Fl 250 ml	RT	6 Wochen	RT	
9081019	LAXOBERON Abführtropfen 30 ml	RT	6 Monate	RT	
9046677	LENOXIN Liquidum Lös 60 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 10% Alkohol
9085682	LIFO SCRUB Waschlotion 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9060606	LIFO SCRUB Waschlotion Ovalflasche 500 ml	RT	6 Monate	RT	
9044058	LOCOID CRELO Emuls 0.1 % 30 g	RT	6 Monate	RT	
4000963	LUBEX Extra Mild liq Ph 5.5 150 ml	RT	6 Monate	RT	
4000683	MALTOFER Tropfen	RT	6 Monate	RT	
9057164	METHACHOLIN Inh Lös 4 % Fl 2 ml	KS	24 Stunden	KS	
4001673	METHADON HCL Lösung 10 mg/ml 1000 ml	RT	6 Monate	RT	Entnahme mit Oraldispenser (zum einmaligen Gebrauch bestimmt)
4001720	METHADON HCL Trinklösung 10 mg/ml 50 ml	RT	6 Monate	RT	Entnahme mit Oraldispenser (zum einmaligen Gebrauch bestimmt)
9071811	METHOCEL Gtt Opht 2 % 10 g	RT	3 Monate	RT	Flasche auf dem Kopf stehend lagern
9107072	MICROPAQUE Susp 500 ml	RT	6 Monate	RT	bei Sedimentation vor Gebrauch schütteln
9050640	MIDAZOLAM Trinklösung 2 mg/ml 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9006208	MORPHIN HCL Trinklösung 20mg/ml 30 ml	RT	6 Monate	RT	Entnahme mit Oraldispenser (zum einmaligen Gebrauch bestimmt)
4003651	MOTILIUM Susp 1 mg/ml 200 ml	RT	6 Monate	RT	
9118587	MUNDISAL Gel o Zucker 10 g	RT	1 Jahr	RT	enthält 43% Alkohol
9069177	NASIVIN PUR Dosierspray 0.025 % 10 ml	RT	1 Jahr	RT	
9069178	NASIVIN PUR Dosierspray 0.05 % 10 ml	RT	1 Jahr	RT	

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9047656	NASIVIN Tropfen 0.01 % Bébé 5 ml	RT	6 Monate	RT	
9050828	NASIVIN Tropfen 0.025 % Inf 10 ml	RT	6 Monate	RT	
9032426	NASIVIN Tropfen 0.05 % Ad 10 ml	RT	6 Monate	RT	
9016029	NATRIUM BENZOAT TrinkLsg. 100mg/ml 200ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9081874	NATRIUMCHLORID Inh. 30mg/ml 5x5 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	
9092946	NEOSYNEPHRIN-POS 5% Gtt Opht 10ml	RT	4 Wochen	RT	
9012329	NERVIFENE liq neue Formel 125 ml	RT	6 Monate	RT	
9035550	NEURODOL TISSUGEL Pfl 10 Stk	RT	3 Monate	RT	Nach dem ersten Öffnen des Beutels sind die Pflaster innerhalb von 3 Monaten zu verwenden
4001135	NIZORAL Shampoo 20 mg 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9046487	NOFIL Sirup Inf 100 ml	RT	4 Wochen	RT	
4001145	NOVALGIN Tropfen 10 ml	RT	6 Monate	RT	
9076245	NOXAFIL Susp 40 mg/ml Fl 105 ml	RT	4 Wochen	RT	
4001827	NOZINAN Tropfen 4 % 30 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 15% Alkohol
9090334	OCTENIDERM Lös farblos 1 lt	RT	6 Monate	RT	
9088629	OCTENIDERM Lös farblos mit Verschluss 250 ml	RT	6 Monate	RT	
9068495	OCTENISEPT Lös farblos Fl 250 ml	RT	6 Monate	RT	
9085776	OCTENISEPT Lös farblos Fl 500 ml	RT	6 Monate	RT	
4002847	OCULOSAN Gtt Opht 10 ml	RT	4 Wochen	RT	
9063833	OLIVENÖL Ph. Eur. 50 ml Hänsele	RT	6 Monate	RT	
4002101	OPIUMTINKTUR Tropfen 30 ml	RT	6 Monate	RT	
9028072	ORFIRIL Sirup 300 mg/5ml 250 ml	RT	3 Monate	RT	für Kinder und Diabetiker geeignet; nicht mit kohlenensäurehaltigen Getränken einnehmen
9008215	OSPEN 400 Sirup 120 ml	KS	6 Monate	KS	
4001170	OTALGAN Tropfen 12 g	RT	3 Monate	RT	
9061488	OXYNORM Tropfen 10 mg/ml Fl 30 ml	RT	ganze Laufzeit	RT	
9046320	PARAGOL N Emuls 500 ml	RT	6 Monate	RT	
9012005	PASPERTIN TROPFEN 100 ML	RT	6 Monate	RT	
9046494	PODOMEXEF Gran 40 mg/5ml Inf für Trinksusp 100 ml	RT	10 Tage	KS	
9107627	PONSTAN Susp 50 mg/5ml 125 ml	RT	6 Monate	RT	
9101122	Povidon-Jod Augentropfen 12mg/ml 5ml	RT	7 Tage	RT	
4003691	PRED FORTE Gtt Opht 1 % 5 ml	RT	4 Wochen	RT	vor Gebrauch schütteln; Tropferspitze sauber halten; Flasche aufrecht stellen damit Tropfer nicht verklebt
9015186	PROCUTOL Haut Waschlotion 175 ml	RT	6 Monate	RT	

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9082750	PRONTOSAN Wundreinigung Gel FI 30 ml	RT	2 Monate	RT	Flasche sofort schliessen, Flaschenöffnung vor Kontamination schützen. Flaschen, die in direkten Kontakt mit der Wunde gekommen sind oder auf sonstige Weise verunreinigt wurden, sollten entsorgt werden.
9113951	PRONTOSAN Wundspüllösung steril 350 ml	RT	2 Monate	RT	Flasche sofort schliessen, Flaschenöffnung vor Kontamination schützen. Flaschen, die in direkten Kontakt mit der Wunde gekommen sind oder auf sonstige Weise verunreinigt wurden, müssen entsorgt werden.
9017678	PRURI-MED Emuls 150 ml	RT	6 Monate	RT	
9008154	PSYCHOPAX Tropfen 20 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 38% Alkohol
4003609	Pulmicort Inhal Lösung 0.5 mg/ml 20 Respule 2 ml	RT	12 Stunden	RT	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 3 Monaten verwenden, Lichtschutz einhalten. Aufrecht lagern.
9009510	PYRALVEX Berna Lös mit Pinsel 10 ml	RT	6 Monate	RT	bei Kontakt mit Haut und Schleimhaut entsteht eine vorübergehende Braunfärbung; enthält 60% Alkohol
4002018	RESYL PLUS Tropfen 20 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 53% Alkohol
9062417	RETINORAL Gel Tb 5 g 5 Stk	KS	ganze Laufzeit	KS	
4004026	RETROVIR AZT Sirup 10 mg/ml 200 ml	RT	6 Monate	RT	nicht mit Lebensmitteln oder anderen Arzneimitteln mischen
9087844	RIFADIN Sirup 100mg/5ml FI 120ml	RT	6 Monate	RT	
9007331	RISPERDAL Lös 1 mg/ml 100 ml	RT	3 Monate	RT	inkompatibel mit Tee
9115360	RIVOTRIL Tropfen 2.5 mg/ml 10 ml	RT	4 Monate	RT	Die Lösung der Rivotril Tropfen ist blau gefärbt. Rivotril Tropfen können mit Wasser, Tee, oder Fruchtsäften gemischt werden.
9074796	SACCHAROSE Trinklösung 20% 15ml	RT	4 Wochen	RT	
4002895	SALVIA Wild Tropfen 50 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 40% Alkohol
4003898	SANDIMMUN NEORAL Trink Lös 100 mg 50 ml	RT	2 Monate	RT	möglichst nicht unter 20°C sonst Verdickung (reversibel); kein Grapefruitsaft zum Verdünnen verwenden; Pipette nicht mit Verdünnungsflüssigkeit in Berührung bringen; enthält 12 % Alkohol
4001393	SCHILLER LOESUNG 100 ML	RT	6 Monate	RT	
4002832	SCOPOLAMINE Dispersa Gtt Opht 0.25 % 10 ml	RT	4 Wochen	RT	
9057278	SKINMAN SOFT F Händedesinfektion FI 100 ml	RT	6 Monate	RT	
9057279	SKINMAN SOFT F Händedesinfektion FI 500 ml	RT	6 Monate	RT	

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9126614	SOFTASEPT N gefärbt Hautdesinfekt 250 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 74% Alkohol
9076807	SOFTASEPT N Hautdesinfekt gefärbt 1000ml	RT	6 Monate	RT	enthält 74% Alkohol
9087986	SOLUPRED Trink Lös 1 mg/ml FI 50 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 4% Alkohol
9121516	Sonnenblumenöl 30 ml 20 Stk	RT	6 Monate	RT	
4002825	SPERSACARPINE Gtt Opht 2 % 10 ml	RT	4 Wochen	RT	
9112541	SPERSAPOLYMYXIN Gtt Opht 5 ml	KS	4 Wochen	KS	
9070703	STERILLIUM CLASSIC PureHändedesinf 100ml	RT	6 Monate	RT	
9071159	STERILLIUM CLASSIC PureHändedesinf 500ml	RT	6 Monate	RT	
9087623	STERILLIUM PURE Händedesinfektion Gel FI 475 ml	RT	6 Monate	RT	
4003255	SURMONTIL Tropfen 4 % 30 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 11% Alkohol
9121170	TAMIFLU Piv 6 mg/ml für Susp FI 13 g	RT	17 Tage / 10 Tage	KS / RT	
9067546	TANNO HERMAL Schüttelmixtur Lot FI 100 g	RT	6 Monate	RT	
4001860	TEGRETOL Susp 2 % 250 ml	RT	3 Monate	RT	Vor Licht schützen
4003258	TELEBRIX GASTRO Lös FI 100 ml	RT	24 Stunden	RT	vor Röntgenstrahlen schützen
9032445	TENAPHIN BLAU Lös 10 mg/ml 50 ml	RT	4 Wochen	RT	
9053484	TENAPHIN ROT Lös 5 mg/ml 50 ml	RT	4 Wochen	RT	
9013355	Tetracaine SDU Faure 1 % 20 Monodosis 0.4 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 4 Wochen verwenden
9099581	TIMISOL SDU Gtt Opht 0.25%	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach dem Öffnen des versiegelten Beutels nicht länger als 6 Monate verwenden
9037933	TIMISOL SDU Gtt Opht 0.5%	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach dem Öffnen des versiegelten Beutels nicht länger als 6 Monate verwenden
9011438	TOBRADEX Augensalbe	RT	4 Wochen	RT	
9013388	TOBRADEX Gtt Opht	RT	4 Wochen	RT	vor Gebrauch gut schütteln
4002856	TOBEX Gtt Opht 5 ml	RT	4 Wochen	RT	
9081801	TOPLEXIL N Sirup ohne Zucker 150 ml	RT	6 Monate	RT	
4001702	TRAMAL Tropfen 100 mg/ml 10 ml	RT	6 Monate	RT	
4003984	TRAMAL Tropfen 100 mg/ml Dosierpumpe 96ml	RT	6 Monate	RT	
9028771	TROPICAMIDE Gtt Opht 0.5 % 20 x 0.4 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	4 Wochen nach Öffnen des Blisters sind übriggebliebene Einzeldosen zu vernichten
9064731	TROPIPHEN Augentropfen 10 ml	RT	4 Wochen	RT	
4004013	TRUSOPT Gtt Opht 2 % FI 5 ml	RT	4 Wochen	RT	
9125016	TRYBOL Kräutermundwasser	RT	6 Monate	RT	
4002052	ULCOGANT Susp 0.2 g/ml FI 250 ml	RT	13 Wochen	KS	nicht mit gerbsäurehaltigen Flüssigkeiten (z.B.schwarzer Tee) mischen

Haltbarkeit nach Anbruch

SAP-Nr	Materialkurztext	Lagertemp.	Haltbarkeit geöffnet	Lagertemp. geöffnet	Bemerkungen
9008148	VAGOCLYSS Lös 120 ml	RT	6 Monate	RT	nicht in Schwangerschaft anwenden
4001733	VALORON Tropfen 50 mg/0.5ml 20 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 19% Alkohol
9029341	VALVERDE Verstopfung Sirup 200 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 4% Alkohol
9029383	Ventolin Inhal Lös 0.05 % 60 Monodosis 2.5 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 3 Monaten verwenden, Lichtschutz einhalten
9028769	VENTOLIN Lös 0.5 % f Aerosolgeräte 20 ml	RT	4 Wochen	RT	Rückstände im Vernebler verwerfen
4002300	VI DE 3 Tropfen 4500 E/ml 10 ml	RT	6 Monate	RT	enthält 65% Alkohol
9108025	VIMPAT Sirup 10 mg/ml	RT	4 Wochen	RT	
9049726	VIRAMUNE 50 mg/ 5 ml Susp 240 ml	RT	6 Monate	RT	
9017248	VOLTAMICIN Ciba Vision Gtt Opht o Konserv 5 ml	RT	4 Wochen	RT	nach Applikation verschwommenes Sehen möglich
4004087	VOLTAREN OPTHATHA SDU Gtt Opht 20 x 0.3 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	nach Öffnen des Beutels diesen nicht länger als einen Monat verwenden.
4002764	WASSERSTOFFPEROXID LÖSUNG 3% 100ML	RT	6 Monate	RT	
4002765	WASSERSTOFFPEROXID LÖSUNG 3% 400ML	RT	6 Monate	RT	
9121322	WELEDA BABY Calendula Babyöl	RT	6 Monate	RT	
9012944	WELLVONE Susp 750 mg/5ml 210 ml	RT	6 Monate	RT	
4002098	X PREP liq 75 ml	KS	zum Einmalgebrauch	/	enthält 2.75% Alkohol
9024533	XALATAN Gtt Opht 2.5 ml	RT	4 Wochen	RT	Ausfällung mit thiomersalhaltigen Augentropfen, im Abstand von 5 Min. applizieren
4001772	XYLOCAIN, PUMPSPRAY 50 ML 10%	RT	6 Monate	RT	
9058973	XYZAL Tropfen FI 20 ml	RT	6 Monate	RT	
9059021	ZADITEN OPTHATHA SDU Gtt Opht 20 x 0.4 ml	RT	zum Einmalgebrauch	/	Geöffnete Beutel 3 Monate haltbar (vor Licht geschützt in der Faltschachtel)
9027127	ZINAT Susp 125 mg/5ml 70 ml	RT	10 Tage	KS	Die Suspension kann bei Bedarf kurz vor der Einnahme einem kalten Kindergetränk wie Fruchtsaft oder Milch beigemischt werden, vor Licht geschützt aufbewahren

Kriterien