

Informationsblatt

Xarelto®



Einfach besser*



Lungenembolie-
Behandlung*




Thrombose-
Behandlung*



Rezidiv-
prophylaxe
einer TVT und LE*



Schlaganfall-
prophylaxe*



Thrombose-
prophylaxe*

Einmal täglich 1 Tablette

Erste 3 Wochen zur Behandlung der TVT und LE 15mg 2x täglich

***Besser als bisheriger Therapiestandard (VKA, NMH)^{†,1-5}**

*Vollständige Indikation gemäss Fachinformation.

†Bessere Wirksamkeit oder besserer klinischer Nettonutzen als bisheriger Antikoagulationsstandard.



Xarelto®
rivaroxaban

Xarelto® – Indikationen und Dosierungen

Behandlung der Lungenembolie (LE) und tiefen Venenthrombosen (TVT)



Woche 1–3

Xarelto® 15 mg

2x täglich 1 Tablette



Ab Woche 4

Xarelto® 20 mg

1x täglich 1 Tablette



Single-Drug Therapie –
15 mg und 20 mg Tabletten
mit einer Mahlzeit einnehmen.¹



Rezidivprophylaxe einer LE und TVT



Xarelto® 20 mg

1x täglich 1 Tablette



Fixe Dosierung –
20 mg Tabletten
mit einer Mahlzeit einnehmen.¹

Vorhofflimmern (VHF)

- ◆ Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern¹



Xarelto® 20 mg

1x täglich 1 Tablette



15 mg bei eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance 15–49 ml/min*)

Fixe Dosierung –
15 mg und 20 mg Tabletten
mit einer Mahlzeit einnehmen.¹

Orthopädie

- ◆ Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen¹



Xarelto® 10 mg

1x täglich 1 Tablette



Fixe Dosierung –
10 mg Tabletten können mit
oder ohne Mahlzeit
eingenommen werden.¹

Wie stelle ich Patienten auf Xarelto® ein?

- ◆ Neu-Einstellung auf Xarelto®: Start mit der empfohlenen Dosierung ab Tag 1¹
- ◆ Umstellung von VKA auf Xarelto®:¹



Wann ist Xarelto® kontraindiziert?¹

- ◆ Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe gemäss Zusammensetzung
- ◆ Dialysepflichtige Niereninsuffizienz
- ◆ Schwere Lebererkrankung und schwere Leberinsuffizienz mit relevant erhöhtem Blutungsrisiko sowie bei leichter und mässiggradiger Leberinsuffizienz in Kombination mit Koagulopathie
- ◆ Akuter gastrointestinaler Ulcus oder gastrointestinale ulzerative Erkrankungen
- ◆ Klinisch signifikante aktive Blutungen
- ◆ Schwangerschaft und Stillzeit
- ◆ Akute bakterielle Endokarditis

Perioperatives Management

- ◆ Vor und nach invasiven Verfahren und chirurgischer Intervention: alle Dosierungen






Wie muss die Dosis bei Niereninsuffizienz angepasst werden?




Nur 33 % der aktiven Substanz werden renal ausgeschieden.¹

Kreatinin-Clearance	Behandlung und Rezidivprophylaxe der LE und TVT	Schlaganfallprophylaxe bei VHF	Thromboseprophylaxe
15–49* ml/min	Keine Dosisanpassung	Dosisanpassung auf 15 mg	Keine Dosisanpassung
< 15 ml/min	Anwendung bei dialysepflichtiger Niereninsuffizienz kontraindiziert		

* Bei Kreatinin-Clearance 15–29 ml/min nur mit Vorsicht anwenden. Mit Vorsicht bedeutet, dass ein genaues Abwägen von Risiko und Nutzen durch den behandelnden Arzt unerlässlich ist. Patienten müssen vor dem Beginn der Behandlung mit Xarelto® sorgfältig auf Anzeichen für Blutungskomplikationen und Anämien überwacht werden. Im Falle eines ungeklärten Hb- oder Blutdruckabfalls sollte nach einer Blutungsquelle gesucht werden. Bei Patienten mit einer Kreatinin-Clearance ≤ 29 ml/min sollte die plasmatische Gerinnung kontrolliert werden.¹

Xarelto® – Artikelstammdaten und Preise

  			
Xarelto® 20 mg*			
Packungsgrössen	14 Filmtabletten	28 Filmtabletten	98 Filmtabletten
Pharmacode	5249684	5249690	5249709
GTIN	7680587280205	7680587280212	7680587280229
Artikel-Nr.	83492989	83492997	83493004
Publikumspreis*	CHF 60.30	CHF 101.60	CHF 328.85

  			
Xarelto® 15 mg*			
Packungsgrössen	14 Filmtabletten	28 Filmtabletten	98 Filmtabletten
Pharmacode	5249649	5249655	5249661
GTIN	7680587280106	7680587280113	7680587280120
Artikel-Nr.	83492911	83492946	83492954
Publikumspreis*	CHF 60.00	CHF 101.60	CHF 328.85

 		
Xarelto® 10 mg*		
Packungsgrössen	10 Filmtabletten	30 Filmtabletten
Pharmacode	4049641	4049658
GTIN	7680587280014	7680587280021
Artikel-Nr.	80811102	80811129
Publikumspreis*	CHF 46.75	CHF 110.30



*inklusive MwSt. #Liste: B

Für Bestellungen von Patientenausweisen sowie weiteren Materialien von Xarelto® können Sie uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren:

Tel.: 044 465 8220, Fax 044 461 2264, E-Mail: orders-hc@bayer.ch

Bei medizinischen Fragen zu Xarelto® können Sie uns telefonisch oder per E-Mail kontaktieren:

Tel.: 044 465 8380, E-Mail: medinfo@bayer.ch

TVT = tiefe Venenthrombose; LE = Lungenembolie; VKA = Vitamin K-Antagonisten; NMH = Niedermolekulare Heparine.

Referenzen: 1. Fachinformation Xarelto® Schweiz (Stand Februar 2014). 2. Eriksson BI et al. Oral Rivaroxaban for the Prevention of Symptomatic Venous Thromboembolism after Elective Hip and Knee Replacement; J Bone Joint Surg 2009; 91-B:636-44. 3. Prins et al. Oral Rivaroxaban versus Standard Therapy for the Treatment of Symptomatic Venous Thromboembolism: a pooled analysis of the EINSTEIN-DVT and PE randomized studies. Thrombosis Journal 2013; 11:21. 4. Bauersachs et al. Oral Rivaroxaban for Symptomatic Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2010 Dec 23;363(26):2499-510. 5. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:883-91.

Gekürzte Fachinformation Xarelto® (Rivaroxaban): Direkter Faktor Xa-Inhibitor **Z:** Filmtabl. zu 10, 15 und 20 mg Rivaroxaban. **I:** a) Thromboseprophylaxe bei grösseren orthopädischen Eingriffen a. d. unteren Extremitäten wie Hüft- und Knieprothesen. b) Behandlung von Lungenembolie (LE) und tiefer Venenthrombose (TVT) sowie Prophylaxe rezidivierender TVT und LE. c) Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe system. Embolien bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern. **D:** a) 1x/Tag 10 mg, b) 2x/Tag 15 mg für die ersten 21 Tage, gefolgt von 20 mg 1x/Tag c) 1x/Tag 20 mg; bei Krea-Cl 15–49 ml/min: 1x/Tag 15 mg. 15 mg und 20 mg während Mahlzeit einnehmen. **KI:** Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe, akute bakt. Endokarditis, klin. sign. aktive Blutungen, schw. Lebererkrankung/Lebersuffizienz (Ll) mit relev. erhöhtem Blutungsrisiko; leichte Ll in Komb. mit Koagulopathie, dialysepflicht. Niereninsuffizienz (NI), akute gastrointestinale (GI) Ulzera oder GI ulzerative Erkrankungen, Schwangerschaft, Stillzeit. **W:** Komedikation (siehe «IA»); <18 Jahre; künstl. Herzklappen; d. Hämostase beeinfl. Arzneimittel. **VM:** NI (Krea-Cl 15–29 ml/min) od. NI in Komb. mit Arzneimitteln, die den Xarelto®-Plasmaspiegel erhöhen, erhöhtes Risiko unkontrollierter Blutungen und hämorrhag. Diathese, kurz zurückliegende hämorrhag. Schlaganfall, intrakran. o. intrazerebr. Hämorrhagie, kürzlich aufgetretene GI Ulzera/ulzerative Erkrankungen, schwere unkontrollierte Hypertonie, vask. Retinopathie, intraspinale o. intrazerebr. Gefässanomalien, kurz zurückliegende Hirn-, Spinal-, Augen-OP, Bronchiektasie oder pulmonale Blutung in der Anamnese, Spinalanästhesie und -punktion, mind. 24 Stunden vor invasiven Verfahren/chirurgischen Eingriffen absetzen, gleichzeitige Gabe von d. Hämostase beeinfl. Arzneimitteln. **Häufige UAW:** Blutungen, Anämie, Schwindel, Kopfschmerz, Augenblutungen, Hämatome, Epistaxis, Hämoptysis, Nausea, Obstipation, Durchfall, Leberenzym erhöhungen (ASAT, ALAT), Pruritus, Rash, Schmerzen i. d. Extrem., Fieber, periph. Ödem, Asthenie. **IA:** Starke CYP 3A4 + P-gp-Inhib. (Ritonavir, Ketzocoazol), starke CYP 3A4 + P-gp-Induk. (Rifampicin, Carbamazepin, Phenobarbital, Johanniskraut), d. Hämostase beeinfl. Arzneimittel. **Stand d. Information:** Feb. 2014. Packg.: 10 mg à 10 und 30; 15 mg und 20 mg à je 14, 28 o. 98 Filmtabl.; jew. Klinikpackung 10x 1 Filmtabl. (B), kassenzulässig. Für weitere Informationen siehe www.swissmedinfo.ch. Vertrieb: Bayer (Schweiz) AG, Bayer Healthcare, Grubenstr. 6, 8045 Zürich. L.CH.HC.04.2014.0413-DE/FR/IT